

Daylong actinica®

Zdravotnícka pomôcka slúžiaca ako prevencia rôznych foriem rakoviny kože u rizikových pacientov (imunosu-primovaných) a ako prevencia svetelných dermatóz.

Vlastnosti

- V rámci dvojročného výskumu zameraného na imunosu-primovaných pacientov (s orgánovými transplantátmi), ktorí sú vysoko náchylní na tvorbu nemelanómovej rakoviny kože (aktinická keratóza, bazocelulárny karcinóm a spinocelulárny karcinóm) preukázal Daylong actinica schopnosť účinnej prevencie aktinickej keratózy a spinocelulárneho karcinómu.
- V priebehu výskumnej štúdie zameranej na pacientov trpiacich svetelnými dermatózami preukázal Daylong actinica vysokú schopnosť ich prevencie.

Daylong actinica chráni pred slnečným žiarením typu UVB aj UVA. Obsahuje fotostabilné a širokospektrálne filtre a je odolný voči vode. Daylong actinica poskytuje veľmi vysokú ochranu pred slnečným žiarením typu UVB. V oblasti UVA spĺňa prísne nároky austrálskej normy. Napriek tomu sa medzi 11. a 15. hodinou vyhýbajte priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia a venujte zvláštnu starostlivosť ochrane pokožky, najmä v južnejších regiónoch (obzvlášť v rovníkovej oblasti).

Daylong actinica má tiež hydratačné vlastnosti, ktoré pomáhajú zlepšiť stav pokožky. Lipozomálne lócio nie je parfémované a neobsahuje bežné PEG emulgátory, čo zaisťuje dobrú znášanlivosť a možnosť aplikovania aj na veľmi citlivú pleť.

Používanie a dávkovanie:

Daylong actinica nanášajte každé ráno pred pobytom na slnku, rovnomerne a v dostatočnom množstve, na pokožku vystavenú počas dňa slnečnému žiareniu. Daylong actinica potrebuje niekoľko minút na vstrebanie do pokožky, a preto ho nanášajte pred použitím iných kozmetických produktov (napr. mejkap). Po dlhšom kontakte s vodou alebo pri silnom potení natieranie opakujte.

Plocha kože jednotlivých častí tela sa líši. Nasledovná tabuľka udáva približné dávkovacie množstvá (stlačenia dávkovača).

Tvář (vrátane uší a nosa)	min. 2 stlačenia
Temeno hlavy	min. 1 stlačenie
Predlaktie	min. 2 stlačenia
Chrbát ruky	min. 1 stlačenie

Pre optimálne rozotrenie a príjemný pocit na koži sa odporúča rozotrieť prvú dávku na tvári a po 5-10 min. rozotrieť dávku druhú. Uistite sa, že medzi prvým a druhým nanášaním neuplynie doba dlhšia ako 10-15 min. Dávkovacie údaje pre tvár, temeno atď. možno použiť ako príklad na stanovenie potrebného dávkovania pre ostatné časti tela.

Na začiatku je potrebné dávkovač viackrát stlačiť, aby došlo k nasatiu lócia a preto prvé stlačenia neobsahujú plné dávky. Dávkovač treba držať kolmo a pomaly stláčať, aby sa dostavili plné dávky.

Aj keď Daylong actinica ponúka maximálnu dlhotrvajúcu ochranu, nemali by ste Vašu kožu nadmerne vystavovať slnku. Rizikovní pacienti s oslabeným imunitným systémom by mali nosiť ochranný odev a vyhýbať sa priamemu kontaktu so slnkom.

Obmedzenia

Výskyt nežiaducich reakcií na niektorú zo zložiek lipozomálneho lócia Daylong actinica nie je možné vylúčiť. Ak dôjde po krátkom pôsobení slnečných lúčov k podráždeniu pleti, výskytu kožnej vyrážky alebo reakcii pripomínajúcej spálenie od slnka, ide zrejme o nežiaduci vedľajší účinok a je nutné použiť iný ochranný prostriedok.

Vyvarujte sa aplikácii v oblasti očí a ako ochranu použite kvalitné slnečné okuliare. Ak príde Daylong actinica do priameho kontaktu s očami, môže spôsobiť pálenie. V prípade, že sa vám prípravok dostane do očí, vypláchnite ich dostatočným množstvom vody!

Starostlivosť o pokožku

Pokožka vystavená teplu a ultrafialovému žiareniu sa silno vysušuje. Po opalovaní sa ošetruje hydratačnými produktmi, napr. Daylong Apres.

Použitie v kombinácii s repelentami


V prípade, že sa Daylong actinica používa súčasne s ochrannými prostriedkami pred hmyzom, treba ako prvý nanášať Daylong actinica; ochrana pred slnkom sa môže oslabiť.

Zvláštne upozornenia

Prípravky chrániace pred slnkom môžu v kombinácii s vonkajšími faktormi viesť k trvalým zmenám farby niektorých materiálov ako napríklad textílií, syntetických materiálov a i. Z tohto dôvodu je vhodné obliecť sa až potom, ako bol prípravok Daylong actinica celkom absorbovaný do pokožky.

Zloženie: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Isoamyl p-Methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propylparaben, Methylparaben, Excipients

Veľkosť balenia

Daylong actinica 80 g  Zdravotnícka pomôcka triedy I

Výrobca:

Spirig Pharma AG
CH-4622 Egerkingen
Švajčiarsko

Kontakt v SR:

SPIRIG Eastern a.s.
Tel: +421 2 4910 90 11
www.daylong.sk

Daylong actinica®

Zdravotnícký prostriedek sloužící jako prevence různých forem rakoviny kůže u rizikových pacientů (imunosu-primovaných) a také jako prevence světelných dermatóz.

Vlastnosti

- V rámci dvouletého výskumu zaměřeného na imunosu-primované pacienty (po orgánových transplantacích), kteří jsou vysoce náchylní ke vzniku nemelanomové rakoviny kůže (aktinická keratóza, bazocelulární karcinóm a spinocelulární karcinóm) prokázal Daylong actinica schopnost účinné prevence aktinické keratózy a spinocelulárního karcinomu.
- V průběhu studie zaměřené na pacienty trpící světelnými dermatózami prokázal Daylong actinica vysokou schopnost jejich prevence.

Daylong actinica chrání před slunečním zářením typu UVB i UVA. Obsahuje fotostabilní a širokospektrální filtry a je odolný vůči vodě. Daylong actinica poskytuje velmi vysokou ochranu před slunečním zářením typu UVB. V oblasti UVA splňuje přísné nároky austrálské normy. I přes to se mezi 11. a 15. hodinou vyhýbejte přímému působení slunečního záření a věnujte zvláštní péči ochraně pokožky, hlavně v jižnějších regionech (obzvlášť poté v rovníkové oblasti).

Daylong actinica má též hydratační vlastnosti, které pomáhají zlepšit stav pokožky. Lipozomální lócio není parfémované a neobsahuje běžné PEG emulgátory, což zajišťuje dobrou snášenlivost a možnost aplikace i na velmi citlivou pleť.

Používání a dávkování:

Daylong actinica nanášejte každé ráno před pobytom na slunci, rovnoměrně a v dostatečném množství na pokožku vystavenou během dne slunečnímu záření.

Daylong actinica potřebuje několik minut na vstřebání do pokožky, a proto ho nanášejte před použitím jiných kosmetických produktů (např. make up). Po delším kontaktu s vodou nebo při silném pocení nátěr opakujte.

Plocha kůže jednotlivých částí těla se liší. Následující tabulka uvádí přibližné dávkovací množství (stlačení dávkovače).

Tvář (včetně uší a nosu)	min. 2 stlačení
Temeno hlavy	min. 1 stlačení
Předloktí	min. 2 stlačení
Hřbet ruky	min. 1 stlačení

Pro optimální rozetření a příjemný pocit na kůži se doporučuje rozetřít první dávku na tváři a po 5-10 min. rozetřít dávku druhou. Ujistěte se, že mezi prvním a druhým nanášením neuplyne doba delší než 10-15 min. Dávkovací údaje pro tvář, temeno atd. lze použít jako příklad pro stanovení potřebného dávkování pro ostatní části těla.

Na začátku je nutné dávkovač vícekrát stlačit, aby došlo k nasátí lócia, a proto první stlačení neobsahují plné dávky. Dávkovač je nutné držet kolmo a pomalu stlačovat, aby se dostavily plné dávky.

I když Daylong actinica nabízí maximální dlouhotrvající ochranu, neměli byste Vaši kůži nadměrně vystavovat slunci. Rizikovní pacienti s oslabeným imunitním systémem by měli nosit ochranný odev a vyhýbat se přímému kontaktu se sluncem.

Omezení

Výskyt nežádoucích reakcí na některou ze složek lipozomálního lócia Daylong actinica není možné vyloučit. Jestliže dojde po krátkém působení slunečních paprsků k podráždění pleti, výskytu kožní vyrážky nebo reakci připomínající spáleninu od slunce, jde zřejmě o nežádoucí vedlejší účinek a je nutné použít jiný ochranný prostředek. Vyvarujte se aplikaci v oblasti očí a jako ochranu použijte kvalitní sluneční brýle. Pokud se dostane Daylong actinica do přímého kontaktu s očima, může způsobit pálení. V případě, že se vám přípravek dostane do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody!

Péče o pokožku

Pokožka vystavená teplu a ultrafialovému záření se silně vysušuje. Po opalování se ošetruje hydratačními produkty, např. Daylong Apres.


Použití v kombinaci s repelenty

V případě, že se Daylong actinica používá současně s ochrannými prostředky chránícími před hmyzem, je třeba nanášet jako první Daylong actinica; ochrana před sluncem se může oslabit.

Zvláštní upozornění

Prípravky, ktoré chránia pred slncom môžu v kombinácii s vnějšími faktory vést k trvalým změnám barvy některých materiálů jako například textílií, syntetických materiálů aj. Z tohoto důvodu je vhodné obléci se až potom, co byl přípravek Daylong actinica zcela absorbovaný do pokožky. **Složení:** Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Isoamyl p-Methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propylparaben, Methylparaben, Excipients

Velikost balení

Daylong actinica 80 g  Zdravotnícký prostředek třídy I

Výrobce:

Spirig Pharma AG
CH-4622 Egerkingen
Švýcarsko

Kontakt v ČR:

SPIRIG Eastern a.s.
Tel: +421 2 4910 90 11
www.daylong.cz

Distributor v ČR:

MOVIANTO Česká republika, a.s.
CZ-664 03 Podolí u Brna

Daylong actinica®

Ιδιότητες

- Το Daylong actinica αποδείχθηκε αποτελεσματικό στην πρόληψη των ακτινικών υπερκερατώσεων και του βασικοκυτταρικού και ακανθοκυτταρικού καρκινώματος, σε μελέτη που διήρκησε δύο χρόνια σε ανοσοκατεσταλμένους (μεταμοσχευμένους) ασθενείς με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του δέρματος, εκτός του μελανώματος.
- Το Daylong actinica αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό, σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς με πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα.

Το Daylong actinica προστατεύει από τη UVB & UVA ακτινοβολία καθώς περιέχει φωτοσταθερά φίλτρα ευρέος φάσματος και είναι ανθεκτικό στο νερό.

Το Daylong actinica ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα. Η απουσία αρώματος και προπυλενογλυκόλων (PEG), εξασφαλίζει την καλή ανοχή του γαλακτώματος ακόμη και από υπερευαίσθητα δέρματα.

Οδηγίες χρήσης και προτεινόμενη δοσολογία

Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο. Να φοράτε ρούχα που θα σας προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Κάθε πρωί, εφαρμόστε το Daylong actinica σε όλες τις περιοχές που θα εκτεθούν στον ήλιο και απλώστε το ομοιόμορφα, πριν από την έκθεση σας στον ήλιο. Εφαρμόστε το Daylong actinica πριν τη χρήση κάποιου άλλου καλλυντικού προϊόντος σας (αφήστε το Daylong actinica για λίγα λεπτά ώστε να απορροφηθεί από την επιδερμίδα). Ανανεώνετε την εφαρμογή του προϊόντος μετά από παρατεταμένη παραμονή στο νερό ή λόγω της έντονης εφίδρωσης.

Η επιδερμίδα διαφέρει από άτομο σε άτομο. Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε τη δοσολογία κατά προσέγγιση (=πίεση δοσομετρητή) για τις διάφορες περιοχές του σώματος σας:

Πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων αυτιών και μύτης)	Τουλάχιστον 2 πιέσεις δοσομετρητή
Τριχωτό της κεφαλής	Τουλάχιστον 1 πίεση δοσομετρητή
Πήχηρς του χεριού	Τουλάχιστον 2 πιέσεις δοσομετρητή
Δάχτυλα των χεριών	Τουλάχιστον 1 πίεση δοσομετρητή

Για να εξασφαλίσετε καλύτερη κατανομή και ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα, μπορείτε να εφαρμόσετε την προτεινόμενη δόση σε 2 εφαρμογές, π.χ. αρχικά μία πίεση του δοσομετρητή και μία δεύτερη πίεση 5-10 λεπτά αργότερα.

Φροντίστε ώστε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης εφαρμογής να μην υπάρχει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 10-15 λεπτών.

Η δοσολογία που αναφέρεται παραπάνω για το πρόσωπο, το τριχωτό της κεφαλής κ.λ.π. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο αναφοράς για τη δοσολογία που χρειάζονται και τα υπόλοιπα σημεία του σώματος.

Αρχικά, χρειάζεται να πιέσετε αρκετές φορές το δοσομετρητή, για να μπορέσει να τρέξει το γαλάκτωμα. Τις πρώτες φορές οι πρώτες πιέσεις δεν αποτελούν επαρκείς δόσεις. Πατήστε αργά για να λάβετε τη σωστή δοσολογία.

Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, προτείνεται να φορούν ρούχα που θα τους προστατεύουν, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Περιορισμοί κατά τη χρήση

Δεν μπορεί να αποκλεισθεί η εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας σε κάποιο από τα συστατικά του Daylong actinica. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, δερματικό εξάνθημα ή αντίδραση παρόμοια με ηλιακό έγκαυμα, μετά από σύντομη έκθεση στον ήλιο, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να διακοπεί.

Να αποφεύγετε την απευθείας επαφή με τα μάτια και να φοράτε γυαλιά ηλίου που σας προσφέρουν προστασία από την UV ακτινοβολία. Το Daylong actinica σε περίπτωση επαφής του με τα μάτια, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα καύσου. Στην περίπτωση αυτή, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Χρήση σε συνδυασμό με εντομοαπωθητικά

Εάν το Daylong actinica χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εντομοαπωθητικό, συνιστάται η χρήση πρώτα του Daylong actinica. Περιμένετε περίπου 15 λεπτά πριν την εφαρμογή του εντομοαπωθητικού. Να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός των δύο αυτών προϊόντων μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του Daylong actinica.

Ειδικές πληροφορίες

Τα αντηλιακά φίλτρα UV στο Daylong actinica μπορεί να προκαλέσουν χρωματικές αλλοιώσεις στα ρούχα, τα συνθετικά υλικά και σε άλλα υλικά. Για το λόγο αυτό αποφύγετε την χρήση του Daylong actinica αμέσως πριν ντυθείτε.

Σύνθεση: Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone, Isoamyl p-Methoxycinnamate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Methylene bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Propylparaben, Methylparaben, Excipients

Συσκευασία

Daylong actinica: 80g Ιατροτεχνολογικό προϊόν Class I



Παρασκευάζεται στην Ελβετία από την:
Spirig Pharma AG, 4622 Egerkingen / Switzerland
www.daylong-actinica.com

ALAPIS ABEE
 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2
 176 71 ΑΘΗΝΑ
 ΤΗΛ: 2130 175064
 FAX: 210 9238675